

VL

Výrokový jazyk nad P tvorí: a) neprázdna množina P **prvovýroku**

(též výrokových promenných či atomu), b) logické spojky \neg, \rightarrow

Výroky cili (výrokové) formule nad P jsou práve designátory (použití F_p) z $D(F_p)$, kde $F_p = P \cup \{\neg, \rightarrow\}$; pritom prvky z P jsou nulární, \neg je unární, \rightarrow je binární. VF_P je množina všech výroků nad P. **var(ϕ)** jsou prvovýroky z ϕ .

Výroková teorie nad P, též **P-teorie**, je množina $T \subseteq VF_P$ její prvky jsou její axiomy. Symbol **P(T)** značí množinu prvovýroku jazyka teorie T. Výrok teorie T je výrok jejího jazyka.

Pravdivý výrok \top specifikujeme jako $p \rightarrow p$, **lživý výrok** \perp jako $\neg(p \rightarrow p)$; na konkrétní volbe p nezáleží.

Výrok je **literál**, je-li to prvovýrok nebo negace prvovýroku. Disjunkce literálu se nazývá **klauzule**, konjunkce literálu též **elementární konjunkce**. Výrok je v DNF resp. CNF, je-li to disjunkce konjunkcí literálu resp. konjunkce disjunkcí literálu.

Pravdivostní ohodnocení P cili **model výrokového jazyka** nad P je funkce $v \in P^2$.

Třída všech modelu teorie T: $M^P(T) = \{v \in P^2; v \models T\}$

Formule ϕ, ψ z VF_P jsou **T-sémanticky ekvivalentní**, pokud $M^P(T, \phi) = M^P(T, \psi)$; píšeme $\phi \sim_T \psi$.

Formule ϕ je sémanticky ekvivalentní formuli jak v DNF, tak formuli v CNF.

(O sémantické ekvivalenci.) Vznikne-li formule ϕ' z ϕ nahrazením některého výskytu podformule ψ formulí ψ' , tak $\psi \sim_T \psi' \Rightarrow \phi \sim_T \phi'$

Př: $(p \rightarrow q) \& q \sim (\neg p \vee q) \& q \sim (\neg p \& q) \vee (q \& q) \sim (\neg p \& q) \vee q \sim q$.

• Fle ϕ je **pravdivá (tautologie)** v teorii T, platí-li \forall modelu T, píšeme $T \models \phi$.

• Fle ϕ je **lživá** v teorii T, neplatí-li v žádném modelu T, píšeme $T \models \neg \phi$.

Množ. všech P-formulí pravdivých resp. lživých v T značíme $\Theta(T)$ resp. $\Theta'(T)$ Platí: 1) $M(\Theta(T)) = M(T)$ 2) $T \subseteq \Theta(T)$

$T \subseteq S \rightarrow \Theta(T) \subseteq \Theta(S)$ $\Theta(T) = \Theta(\Theta(T))$

• Není-li ϕ ani pravdivá ani lživá v T, je **nezávislá** v T

• Není-li ϕ lživá v T je **splnitelná (konzistentní)** v T

• Když $T \models \phi \rightarrow \psi$, je ϕ **silnější** než ψ a ψ **slabší** než ϕ v T

Teorie S je **extenze (rozšíření)** T, když $P(T) \subseteq P(S)$ a $\Theta(T) \subseteq \Theta(S)$ nebo $\Leftrightarrow M(S) \subseteq M(T)$. Je-li $P(T) = P(S)$, je to **jednoduchá extenze**. Teorie T je **ekvivalentní** s S, je-li každá z nich extenzí druhé nebo $\Leftrightarrow M(S) = M(T)$.

Teorie je **konecne axiomatizovatelná**, je-li ekvivalentní teorii s konecne axiomy.

Teorie T je **kompletní**, jestliže má model a \forall formuli ϕ jejího jazyka je $T \models \phi$ nebo $T \models \neg \phi$, tj. T nemá nezávislý výrok, a nebo \Leftrightarrow má právě 1 model.

(O sémantické kompaktnosti.) Teorie má model \Leftrightarrow každá její konečná část má model.

Množina $K \subseteq P^2$ je **axiomatizovatelná** resp. **konecne axiomatizovatelná**, existuje-li teorie resp. konečná teorie T tak, že $K = M(T)$. Je-li K konecne axiomatizovatelná, je zrejme $K = M(\phi)$ pro nějakou formuli ϕ .

a) **Prunik** neprázdneho systému uzavřených množin je uzavřená množina. b) **Sjednocení** konecne mnoha uzavřených množin je uzavřená množina.

(O axiomatizovatelnosti) 1) Množina $K \subseteq P^2$ je konecne axiomatizovatelná \Leftrightarrow ona i její komplement jsou axiomatizovatelné. 2) a) Množina $K \subseteq P^2$ je axiomatizovatelná \Leftrightarrow je uzavřená (K obsahuje každé v, které není oddelené od K) b) Množina $K \subseteq P^2$ je konecne axiomatizovatelná \Leftrightarrow je obojetná (K i její komplement jsou uzavřené)

(Logické axiomy LAx) (...)

(Pravidlo Modus ponens) A, A \rightarrow B | B

Dukaz v T je $\{MP\}$ -odvození z $T \cup LAx$; je to **dukaz formule**, která je jeho posledním členem. Formule ϕ je **dokazatelná (teorém)** v T, existuje-li nějaký její dukaz v T; píšeme $T \vdash \phi \Leftrightarrow M(T) \subseteq M(\phi)$

Formule ϕ je **vyvratitelná (spor)** v T, když $T \vdash \neg \phi$. Když $T = \emptyset$, vypouštíme v uvedených pojmech výraz „v T“ ci jej nahradíme výrazem „logicky“. Množinu všech teorému teorie T značíme **Thm(T) nebo Thm_T**.

Tedy Thm(T) je $\{MP\}$ -uzáver $T \cup LAx$. Speciálně jsou teorémy teorie T definovány induktivne pravidly: • Každý axiom teorie T a každý logický axiom je teorém teorie T • Jsou-li $\phi, \phi \rightarrow \psi$ teorémy teorie T, je ψ teorém teorie T

Teorie T je **sporná**, je-li v ní dokazatelná každá formule; jinak je **bezesporná**. Má-li teorie model, je bezesporná.

(O korektnosti.) Každá v T dokazatelná formule je v T pravdivá.

(O dedukci.) $T, A \vdash B \Leftrightarrow T \vdash A \rightarrow B$

(Důkaz sporem) $T, \neg \phi$ je sporná $\Leftrightarrow T \vdash \phi$

(O existenci modelu ve VL) Teorie má model, práve když je bezesporná (není sporná).

(O kompaktnosti v VL) Teorie má model, práve když každá její konečná podteorie má model.

(O úplnosti ve VL/PL) Formule teorie T je v T dokazatelná ($T \vdash \phi$) \Leftrightarrow je v T pravdivá ($T \models \phi$)

(O ekvivalenci.) Vznikne-li formule ϕ z ϕ' nahrazením některého výskytu podformule ψ formulí ψ' , tak

a) $\vdash \psi \leftrightarrow \psi' \rightarrow \phi \leftrightarrow \phi'$ b) $T \vdash \psi \leftrightarrow \psi' \Rightarrow \phi \leftrightarrow \phi'$

PL

Teorie je dvojice $\langle L, T \rangle$, kde L je jazyk a $T \subseteq F_{mL}$ je množina **mimologických axiomu**, strucneji axiomu. Ríkáme pak také, že T je teorie, a to v jazyce L cili **L-teorie**. Jazyk teorie T značíme $L(T)$ ten je ovšem urcen jednoznacne. Místo $L(T)$ -formule se ríká též **formule teorie T**. **Teorie s rovností** je taková teorie, jejíž jazyk je s rovností.

Teorie rovnosti v L je teorie $TE_L = \emptyset$ v jazyce L s rovností, tj. teorie bez mimologických axiomu v jazyce L s rovností; je-li L prázdny jazyk s rovností, značíme TE_{\emptyset} jako **PE** a ríkáme, že to je **teorie cisté rovnosti**.

x je **vázaná** v A pokud je v nějaké podformuli jako $(\forall x)$ nebo $(\exists x)$ jinak je **volná**. Fle je **uzavřená (sentence)** neobs. volné promenné Fle je **otevřená (bezkvantifikátorová)** neobs. vázané promenné (není-li v ní žádný kvantifikátor). **Teorie je otevřená**, je-li její každý mimologický axiom otevřená formule.

věta 3.1.52. 3) Je-li B model otevřené teorie T, pak každá podstruktura $A \subseteq B$ je také model T.

(Generální) uzáver A je formule $(\forall x_1, \dots, x_n)A$, kde mezi x_1, \dots, x_n jsou všechny volné promenné A. Množinu všech otevřených L-formulí značíme OF_{mL} .

(Logické axiomy LAx)

(PL1) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$

(PL2) $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

(PL3) $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$

(Axiom substitute) $(\forall x)A \rightarrow A(x/t)$ pokud pro každou y z t žádná podle A tvaru $(\forall y)B$ nebo $(\exists y)B$ neobsahuje x volně v A

(Axiom zavedení \forall) $(\forall x)(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow (\forall x)B)$, x není volná v A

(Axiomy rovnosti) $x=x$,

$x_1=y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_n=y_n \rightarrow F(x_1, \dots, x_n) = F(y_1, \dots, y_n)$,

$x_1=y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_n=y_n \rightarrow R(x_1, \dots, x_n) \rightarrow R(y_1, \dots, y_n)$

(Pravidlo Modus ponens) $A, A \rightarrow B \vdash B$

(Pravidlo Generalizace) $A \vdash (\forall x)A$

fle ϕ vyvratitelná (spor) v T, když $T \vdash \neg \phi$, nezávislá v T, když $T \vdash \phi$ a $T \vdash \neg \phi$, konzistentní s T, když $T \vdash \neg \phi$.

Varianta fle – vznikne pomocí substituce

Th(A) - Teorie L-struktury A je množina L-sentencí platných v A. Množina všech teorému T je Thm(T) a pokud jsou i sentence tak

Th(T)

Teorie je κ -kategorická, cili kategorická v kardinalite κ , má-li až na izomorfismus jediný model kardinality κ .

Teorie je ω -kategorická, má-li až na izomorfismus jediný model početné kardinality ($=\omega$). Je to spec.případ κ -kategoricnosti.

Model jazyka $L = \langle R, F \rangle$ je L-struktura $A = \langle A, R^A, F^A \rangle$. Pokud L je jazyk s rovností, pak $=^A$ je = identita na A.

(O existenci modelu) Každá bezsporná teorie T má model kardinality nejvýše $\|L(T)\| = \max(\omega, |L|)$ (kard.jazyka teorie T)

(O úplnosti ve VL/PL) Formule teorie T je v T dokazatelná ($T \vdash \phi$) \Leftrightarrow je v T pravdivá ($T \models \phi$)

(O kompaktnosti) Teorie má model, právě když každá její konečná část má model.

T je sporná, je-li v ní dokazatelná každá L(T)-formule; jinak je bezsporná. $T \vdash \perp \Leftrightarrow T$ je sporná

T je kompletní, je-li bezsporná a každá L(T)-sentence je v ní dokazatelná nebo vyvratitelná (pro každou sentenci S obsahuje S nebo $\neg S$)

• κ -kategoricnost (pro κ nespočetná?) nebo ω -kat. \Rightarrow kompletnost

• T má jen nekonečné modely a v nějaké kardinalite $\kappa \geq \|L\|$ má až na izomorfismus jediný model, $\Rightarrow T$ je kompletní.

T' je extenze teorie T, když $L(T) \subseteq L(T')$ a $\text{Thm}(T) \subseteq \text{Thm}(T')$;

T je jednoduchá, když navíc $L(T) = L(T')$.

teorie jsou ekvivalentní, je-li každá z nich extenzí druhé. Pro teorii T tedy platí díky $\text{Thm}(T) = \text{Thm}(\text{Thm}(T))$: T je ekvivalentní s $\text{Thm}(T)$.

Extenze T' teorie T je konzervativní, je-li každá L(T)-formule dokazatelná v T' dokazatelná i v T.

• $T \vdash \perp \Leftrightarrow \phi$ jakmile ϕ je vyvratitelná v T.

• $T \vdash \neg \phi \Leftrightarrow \phi$ jakmile ϕ je dokazatelná v T.

Rozhodnutelnost - vyjadřuje, zda existuje konečný algoritmus, který pro každou formuli určí, zda je v dané teorii dokazatelná nebo není.

Omezené fle jaz.L – nejm.obor L-flí obs.všechny otevřené a je uzavřený na log.spojky a má omezenou kvantifikaci ($Qx \leq y$)

Σ_1 fle je tvaru $(\exists x)\phi$ kde ϕ je nějaká omezená fle

T je Σ_1 axiomizovaná jeli její axiomatika Σ_1

(4.2.13 (2)) Kompletní Σ_1 -axiomizovaná (rekurzivně axiomizovaná) teorie T je rozhodnutelná.

relace $R \subseteq N^2$ je Σ_1 -kompletní L-teorie T, když:

a) R je Σ_1 ,

b) pro každé $a \in \text{dom}(R)$ je $R[a]$ L-axiomatika kompletní extenze teorie T,

c) každá kompletní L-extenze T je ekvivalentní L-teorii s axiomatikou tvaru $R[a]$.

(Kompletní kritérium rozhodnutelnosti.) Když teorie T je Σ_1 -axiomizovaná a má Σ_1 -kompletní, je rozhodnutelná.

Struktura A je silně nerozhodnutelná, je-li nerozhodnutelná každá teorie, která ji má za model. (např. standardní model \mathcal{N} přirozených čísel)

(O nerozhodnutelnosti.) Bezsporná teorie rozšiřující Robinsonovu ar. Q je nerozhodnutelná a je-li navíc Σ_1 -axiomizovaná, není kompletní.

(První Gödelova veta.) Bud T bezsporné Δ_1 -axiomizované rozšíření Q. Pak existuje Π_1 -sentence pravdivá v \mathcal{N} a nedokazatelná v T.

ELIMINACE

$A \prec B$ (elementární podstruktura) pokud $A \subseteq B$ a $\forall \phi(\bar{x})$ jazyka

A a $\bar{a} \in A^{\wedge}(\bar{x})$ platí: $A \models \phi[\bar{a}] \Leftrightarrow B \models \phi[\bar{a}]$

T je modelově kompletní, když pro \forall její modely A, B s $A \subseteq B$ je $A \prec B$.

Budte A, B dve L-struktury. Funkce $f: A \rightarrow B$ je vnorení \mathcal{A} do \mathcal{B} , je-li prostá a dále platí:

• $\forall m > 0$ a $\forall m$ -ární relacní symbol R jazyka L a $a_1, \dots, a_m \in A$ je $R^A(a_1, \dots, a_m), R^B(f(a_1), \dots, f(a_m))$.

• $\forall m$ a $\forall m$ -ární funkční symbol F jazyka L a $a_1, \dots, a_m \in A$ je $f(F^A(a_1, \dots, a_m)) = F^B(f(a_1), \dots, f(a_m))$.

Je-li $f[\mathcal{A}] \prec \mathcal{B}$, říkáme, že f je elementární vnorení \mathcal{A} do \mathcal{B} , nebo $(\mathcal{A} \models \phi(\bar{a})) \Leftrightarrow (\mathcal{B} \models \phi(f(\bar{a})))$

Model T je její algebraický prvomodel lze-li jej vnorit do každého modelu T. Prvomodel lze elementárně vnorit do každého modelu T.

Parciální vnorení \mathcal{A} do \mathcal{B} je funkce $f \subseteq A \times B$ taková, že $\mathcal{A} \models \phi[\bar{a}]$, $\mathcal{B} \models \phi[f(\bar{a})]$ platí pro každou atomickou (otevřenou) L-formuli

$\phi(\bar{x})$ a $\bar{a} \in \text{dom}(f)^{l(x)}$. Takové parciální vnorení f lze

bezprostředně prodloužit, když pro každé $a \in A$ existuje $b \in B$ tak, že $f \cup \{ \langle a, b \rangle \}$ je parciální vnorení \mathcal{A} do \mathcal{B} .

• T má algebraický prvomodel a T modelově kompletní \Rightarrow kompletní a algebraický prvomodel = prvomodel.

eliminace kvantifikátorů definice

1. Nejmenší množina formulí obsahující danou množinu Γ formulí a uzavřená na $\neg, \&, \vee$ se značí $b(\Gamma)$; její prvky se nazývají booleovské kombinace formulí z Γ .

2. Bud Γ množina L-formulí a T teorie v L. Množina Γ je eliminací pro teorii T, jestliže ke každé L-formuli $\phi(\bar{x})$ s $l(\bar{x}) > 0$ existuje booleovská kombinace $\psi(\bar{x})$ formulí z Γ tak, že $T \models \phi(\bar{x}) \Leftrightarrow \psi(\bar{x})$. Je-li Γ množina všech atomických formulí, říkáme, že T má eliminaci kvantifikátoru.

(Eliminací kritérium.) Když pro každé $A \models T, B \models T$ lze každé konečné neprázdné parciální vnorení A do B bezprostředně prodloužit, má T eliminaci kvantifikátoru.

Robinsonova aritmetika Q

Je peanova bez indukce ☺

teorie naslednika SC

Jazyk: $L = \langle S \rangle$, kde S je unární funkční symbol

Axiomy:

(Q0) $(\exists x)((\forall y)(Sy \neq x) \ \& \ (\forall z \neq x)(\exists y)(Sy = z))$

„ex. právě jeden počátek a pak další prvky pokr.souvisle“

(Q2) $Sx = Sy \rightarrow x = y$

SC-schema $x \neq S^n x$; $n > 0$ je přirozené

teorie grafu Gh

Teorie Gh grafu (obyčejných neorientovaných bez smyček)

Jazyk: $L^{gh} = \langle E \rangle$, kde E je binární relacní symbol

Axiomy: $xEy \rightarrow yEx, \neg (xEEx)$.

„Lehky“

Neekvivalentní (kompletní) P-teorie.

Existuje 2^{2^l} neekvivalentních P-teorií a právě 2^l kompletních neekvivalentních P-teorií.

Všech modelů na $|P| = 1$ prvovýrocích je 2^l (každý prvovýrok může nabývat jedné ze dvou hodnot). Teorie je kompletní, právě když má právě jeden model. Teorie jsou neekvivalentní, když mají různé třídy modelů. Proto počet **kompletních neekvivalentních P-teorií** je 2^l (stačí vybrat jeden z možných modelů).

Když nemusí být teorie kompletní, může mít modelů více – a to libovolnou podmnožinu možných modelů. Takových podmnožin je 2^{2^l} , proto je tolik i **neekvivalentních P-teorií**.

P množina prvovýroků velikosti l, p je prvovýrok z P:

a) určete počet neekvivalentních teorií T takových, že $T \models p$ (v T je dokazatelné p)

b) určete počet neekvivalentních teorií T takových, že T sjednoceno s {p} je sporná teorie

a) p musí být ve všech T – jako bysme měli o 1 prvovýrok min (počet ohodnocení 2^l je 2^l , počet podmnožin 2^l je 2^{2^l}), takže 2^{2^l-1}

b) $\neg p$ musí být ve všech T – jako bysme měli o 1 prvovýrok min (počet ohodnocení 2^l je 2^l , počet podmnožin 2^l je 2^{2^l}), takže 2^{2^l-1}

Neekvivalentní pravdivé, lživé a nezávislé výroky.

Teorie T má $2^{2^l - |M(T)|}$ neekvivalentních pravdivých a také lživých výroků a dále má $(2^{2^l - |M(T)|} - 2) * 2^{2^l - |M(T)|}$ nezávislých.

• Výrok a je **pravdivý** v T, neboli $T \models a$, jestliže platí v každém modelu teorie T, neboli $M(T) \subseteq M(a)$. Všechny neekvivalentní pravdivé výroky v T mají stejné ty modely, které má T a liší se v těch ostatních. Tedy nás zajímá, kolik je těch ostatních – tolik, co podmnožin $2^l - |M(T)|$. Proto má T $2^{2^l - |M(T)|}$ neekvivalentních pravdivých výroků.

• Výrok a je **lživý** v T, jestliže $T \models \neg a$, neboli $\neg a$ platí v každém modelu jako T. Tedy stejnou úvahou jako v předchozím (je místo a uvažujeme $\neg a$) dojdeme ke stejnému výsledku $2^{2^l - |M(T)|}$.

• Počet všech neekvivalentních **nezávislých** výroků v T je počet všech – počet pravdivých – počet lživých, tedy $2^{2^l} - 2^{2^l - |M(T)|} - 2^{2^l - |M(T)|} = 2^{2^l} - 2 * 2^{2^l - |M(T)|} = (2^{|M(T)|} - 2) * 2^{2^l - |M(T)|}$

Teorie T = {p0, p0 \Rightarrow p1} nad množinou prvovýroku P={p0, p1, p2}

a) Kolik existuje neekvivalentních pravdivých výroku teorie T?

b) Kolik existuje neekvivalentních lživých výroku teorie T?

c) Kolik existuje neekvivalentních nezávislých (ani pravd. ani lživých) výroku teorie T?

$M(T) = \{ \langle 1, 1, 0 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle \}$, $|M(T)| = 2$

a) počet různých $M(\varphi)$ (S je ekv. $T \Leftrightarrow M(S) = M(T)$) takových, že $M(T) \subseteq M(\varphi)$ je tolik, kolik je podmnožin množiny $2^l - |M(T)|$, takže $2^{2^l - |M(T)|}$

b) pravdivé negované, takže $2^{2^l - |M(T)|}$

c) všechny neekvivalentní (počet ohodnocení 2^l je 2^l , počet podmnožin 2^l je 2^{2^l}) – pravdivé a lživé neekvivalentní, takže $2^{2^l} - 2 * 2^{2^l - |M(T)|} = (2^{|M(T)|} - 2) * 2^{2^l - |M(T)|}$

a) počet nezávislých neekv. výroků v teorii T

b) počet vyvrátitelných výroků v teorii T

c) výrok a, spočítejte počet neekv. výroků b: v T není dokazatelné a \rightarrow b a v T není dokazatelné b \rightarrow $\neg a$

a) všechny neekvivalentní (počet ohodnocení 2^l je 2^l , počet podmnožin 2^l je 2^{2^l}) – pravdivé a lživé neekvivalentní, takže $2^{2^l} - 2 * 2^{2^l - |M(T)|} = (2^{|M(T,a)|} - 2) * 2^{2^l - |M(T,a)|}$

b) počet negovaných dokazatelných, takže: počet různých $M(\varphi)$ takových, že $M(T) \subseteq M(\varphi)$ je tolik, kolik je podmnožin množiny $2^l - |M(T)|$, takže $2^{2^l - |M(T)|}$

c) b \rightarrow $\neg a$ se převede na a \rightarrow $\neg b$ a pak se počítá počet neekv. nezávislých výroků v T, a: $(2^{|M(T,a)|} - 2) * 2^{2^l - |M(T,a)|}$

Řekl mi, že $|P| = l \in \mathbb{N}$ a teorie T má k dokazatelných výroků -- otázka tedy byla, kolik má modelů.

Použil sem vzoreček $k = 2^{2^l - |M(T)|}$ a pak je to: $|M(T)| = 2^l - \log(k) / \log(2)$

Dodatečná otázka byla, „Co když ta teorie bude kompletní?“

Bude mít právě jeden model

Neekvivalentní (kompletní) jednoduché extenze teorie

Existuje právě $|M(T)|$ neekvivalentních kompletních jednoduchých extenzí T a $2|M(T)|$ neekvivalentních jednoduchých extenzí T (z nichž jedna je sporná).

Teorie S je extenze T , jestliže $\Theta(T) \subseteq \Theta(S)$, což je právě tehdy, když $M(S) \subseteq M(T)$. S je jednoduchá extenze T , jestliže $P(T) = P(S)$.

Extenze S teorie T tedy má některé z modelů teorie T , kterých je $|M(T)|$. Pokud má být S kompletní, tak musí mít model jediný, tedy **neekvivalentních jednoduchých kompletních extenzí** teorie T je $|M(T)|$

Pokud nemusí být S kompletní, tak si vybere libovolnou podmnožinu modelů T , tedy **neekvivalentních jednoduchých extenzí** T je $2^{|M(T)|}$

Množina prvovýroků $P=\{p,q,r\}$ a teorii $T=\{q, p \vee r\}$. Otázky:

a) počet neekvivalentních jednoduchých extenzí teorie T

b) počet neekvivalentních nezávislých výroků teorie T

$M(T)=\{ \langle 1,1,0 \rangle, \langle 0,1,1 \rangle, \langle 1,1,1 \rangle \}$, $|M(T)|=3$

a) počet podmnožin $M(T)$, protože extenze má model vždy podmnožinu $M(T)$ (**2.1.12. 1**)), takže $2^{|M(T)|}$

b) všechny neekvivalentní (počet ohodnocení $^P 2$ je 2^1 , počet pomnožin $^P 2$ je 2^2) – pravdivé a lživé neekvivalentní, takže $2^2 - 2 = 2 * 2^{(2^1 - |M(T)|)} = (2^{|M(T)|} - 2) * 2^{(2^1 - |M(T)|)}$

T -sémanticky neekvivalentní nezávislé výroky teorie T

Kolik je T -sémanticky neekvivalentních nezávislých výroků teorie T ?

Výroky a a b jsou **T-sémanticky ekvivalentní**, neboli $a \sim_T b$, jestliže

$M(T,a) = M(T,b)$, neboli $M(T \cup a) = M(T \cup b)$. Neboli $M(T) \cap M(a) = M(T) \cap M(b)$.

Ukážeme, že dva libovolné výroky a, b pravdivé v T jsou T-sémanticky ekvivalentní.

$T \models a, M(T) \subseteq M(a) \Rightarrow M(T, a) = M(T) \cap M(a) = M(T)$.

$T \models b, M(T) \subseteq M(b) \Rightarrow M(T, b) = M(T) \cap M(b) = M(T)$.

Tedy T -sémanticky neekvivalentní výrok pravdivý v T je jediný. Stejně tak lživý.

Všech T -sémanticky neekvivalentních výroků je tolik, kolik je podmnožin $M(T)$ (neboť se musí lišit právě v modelech teorie T), tedy $2^{|M(T)|}$.

Proto všech T -sémanticky neekvivalentních nezávislých výroků je $2^{|M(T)|} - 2$.

Neekvivalentní výroky T-sémanticky ekvivalentní fixnímu výroku a

Bud' $a \subseteq V F_p$. Kolik je neekvivalentních výroků b takových, že $a \sim_T b$ (jsou T -sémanticky ekvivalentní a)?

Musí tedy platit, že $M(T) \cap M(a) = M(T) \cap M(b)$. Všechny takové výroky se tedy musí shodovat v těch modelech, co má a společně s teorií T , ale lišit se v těch ostatních. Ty, co má a společně s T , jsou již dané. Zajímá nás tedy jen to, v kolika modelech se mohou lišit – v tolika, co je podmnožin $2^{|M(T)|}$. Proto všech neekvivalentních výroků T -sémanticky ekvivalentních je $2^{|M(T)|} - |M(T)|$

Neekvivalentní výroky b, že $b \models a$ nebo $a \models b$

Nechť a je výrok. Kolik je neekvivalentních výroků b takových, že $b \models a$ nebo $a \models b$?

Neekvivalentních b takových, že $b \models a \Leftrightarrow M(b) \subseteq M(a)$ je tolik, co podmnožin $M(a)$, tedy $2^{|M(T)|}$.

Neekvivalentních b takových, že $a \models b \Leftrightarrow M(a) \subseteq M(b)$ je tolik, co „nadmnožin“ $M(a)$, tedy $2^{(2^1 - |M(T)|)}$.

Neekvivalentní takový, že $b \models a$ a $a \models b$, tedy $M(b) = M(a)$, je jediný (neboť modely a jsou dané a on má mít přesně ty stejné).

Proto neekvivalentních výroků takových, že $b \models a$ nebo $a \models b$ je $2^{|M(T)|} + 2^{(2^1 - |M(T)|)} - 1$ (jednoduchý princip inkluze a exkluze).

Neekvivalentní výroky pravdivé v teorii $\{a \vee b\}$.

Nechť $\{a, b\}$ nemá model. Kolik je neekvivalentních pravdivých výroků c teorie $\{a \vee b\}$?

Má platit $\{a \vee b\} \models c$, tedy $M(a \vee b) = (M(a) \cup M(b)) \subseteq M(c)$. Zajímá nás tedy, kolik je „nadmnožin“ $M(a) \cup M(b)$. Tolik, co podmnožin $2^{(2^1 - (|M(a) \cup M(b)|))}$, tedy $2^{(2^1 - |M(a) \cup M(b)|)}$.

Uvědomme si, že $|M(a) \cup M(b)| = |M(a)| + |M(b)| - |M(a) \cap M(b)| = |M(a)| + |M(b)|$, neboť $M(a) \cap M(b) = \emptyset$, jelikož $\{a, b\}$ nemá dle zadání žádný model.

Tedy neekvivalentních výroků pravdivých v teorii $\{a \vee b\}$ je $2^{(2^1 - |M(a) \cup M(b)|)}$.

Predikativní logika. Předpokládáme jazyk s rovností.

Urcete, zda-li jsou uvedene teorie ekvivalentni nejake otevrene teorii:

a) DiLO

b) teorie grup $\langle +, -, 0 \rangle$

c) teorie následníka SC

d) $T = \{(\exists x, y)R(x, y)\}$, kde R je binarni relacni symbol.

Def.: Teorie je otevřená, je-li její každý mimologický (mimo PL1-3) axiom otevřená formule.

Teorie jsou ekv. pokud $M(T) = M(S)$

věta 3.1.52. 3) Je-li B model otevřené teorie T, pak každá podstruktura $A \subseteq B$ je také model T.

a) DiLO, nema ekvivalentni otevrenou teorii, protoze pro model $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ podstruktura $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ není modelem DiLO (1 nema predchudce).

b) Teorie grup je sama otevrena. (nema žádné kvantifikátory)

c) teorie následníka SC, nema ekvivalentni otevrenou teorii, protoze pro model $\langle \mathbb{N}, S \rangle$ podstruktura $\langle \mathbb{N} - \{2\}, S \rangle$ není modelem SC (1 nema následníka).

d) Posledni teorie nema ekv. otevrenou teorii, opet se vyuzije vyse zminena veta, staci vzit libovolny model teorie a pro tento model muzeme vzit podstrukturu, ktera po zuzeni bude mit $R = \emptyset$, potom nebude modelem T.

T je jednoduchá bezesporná extenze Peanovy aritmetiky. Zdůvodnete, jestli platí nasledující tvrzení:

a) T ma silne nerozhodnutelny model.

c) \mathcal{A} je modelem T. Potom $\text{Th}(\mathcal{A})$ ma silne nerozhodnutelny model.

a) "Teorie" (1.7.2), ze libovolny model \mathcal{A} teorie T (kde T je bezesporná extenze Q) je silne nerozhodnutelna struktura a ze to plyne z vety o nerozhodnutelnosti. Takto:

Pokud T je bezesporná extenze Robinsonovy aritmetiky Q (což jednoduchá bezesporná extenze Peanovy aritmetiky je), tak platí dle věty 4.3.4 (O nerozhodnutelnosti), že je T nerozhodnutelná. Také platí, že $\mathcal{A} \models Q$. A teď ještě potřebujeme ukázat, že každá teorie T', která má \mathcal{A} za model, je nerozhodnutelná. Necht' tedy $\mathcal{A} \models T'$. Pak $T' \cup Q$ je jednoduché rozšíření T' o konečně axiomů. Tedy dle věty 4.3.6 je i T' nerozhodnutelná. Proto A je silně nerozhodnutelná.

c) Již víme, že \mathcal{A} je silně nerozhodnutelná struktura. Dále platí, že $\mathcal{A} \models \text{Th}(\mathcal{A})$. Proto jednak $\text{Th}(\mathcal{A})$ je nerozhodnutelná a zřejmě má i silně nerozhodnutelný model - a to \mathcal{A} .

Rozšiřte Peanovu aritmetiku o axiom sudosti

celej axiom by mel podle me vypadat teda: $\text{Sude}(x) \leftrightarrow (\exists y)(x = S(S(0)) * y)$

důkaz že DeLO má eliminaci kvantifikátorů:

Každé neprázdné konečné parciální vnorení mezi modely DeLO lze jasne bezprostredne prodloužit, DeLO je tedy koexistencní a tedy má eliminaci kvantifikátoru.

Jsou nasledující teorie rozhodnutelne, zdůvodnete:

a) PE (čistá rovnost) rozsirene o schema "existuje nekonecne prvku"

b) $\text{Th}(\mathcal{N})$

c) DeLO*

a) je- je kompletní a je Σ_1 axiomizovana (nema zadne axiomu) (T 4.2.13 (2))

b) $\mathcal{N} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ není rozhodnutelná (\mathcal{N} silně nerozhodnutelná a platí, že $\mathcal{N} \models \text{Th}(\mathcal{N})$, proto jednak $\text{Th}(\mathcal{N})$ je nerozhodnutena a zřejmě má i silně nerozhodnutelný model - a to \mathcal{N})

c) je - má právě 4 neekvivalentní kompletní extenze DeLO -, +, +-, prázdné (ma Σ_1 kompletaci) a muzeme ji vzit jako Δ_1 (rekurzivni)

Urcete

a) κ -kategoričnost a ω -kategoričnost

b) rozhodnutelnost a kompletlost

c) prvomodel a algebraický prvomodel (pokud existují)

U těchto teorií:

1) teorie následníka SC

2) Vektorové prostory nad R

3) DeLO

- 1) a) κ -kategorická (SC má jen nekonečné modely a je kategorická v \forall nespočetné kardinalitě), není ω -kategorická (např. tyto 2 modely v kardinalitě ω : $\langle \mathbb{N}, S \rangle$ a $\langle \mathbb{Z}, S \rangle$ nejsou izomorfní) b) kompletní (plyne z toho že je kategorická v \forall nespočetné kardinalitě), rozhodnutelná (kompletnost + rekurzivní) c) prvomodel, algebraický prvomodel: $\langle \mathbb{N}, S \rangle$
- 2) a) není ω -kategorická, je κ -kategorická pro každý nekonečný kardinal $\kappa > |\mathbb{R}|$ (dva modely T s mohutností κ mají každý bázi o mohutnosti κ a tak jsou izomorfní) b) kompletní (z kategoričnosti), není rozhodnutelná c) $\langle \mathbb{R}, +, -, 0, r \rangle$ (je modelově kompl. \Rightarrow je to i prvomodel)
- 3) a) není κ -kategorická, je ω -kategorická b) kompletní (z ω -kategoričnosti), rozhodnutelná (kompletnost + rekurzivně axiomatizovaná) c) prvomodel, algebraický prvomodel: $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$

Jen mě zarazil, když jsem tvrdil, že z **k-kategoričnosti plyne kompletnost** (což platí) i rozhodnutelnost (to už ne...) Pak chtěl ode mě příklad nějaké teorie, která je právě kompletní a není rozhodnutelná, což jsem našel vymyslel (vzpomněl jsem si na N, která je silně nerozhodnutelná ☺)

Mejme jazyk $\langle c_0, c_1, c_2, c_3 \rangle$ a teorii $T = \{c_i \neq c_j\}$ pro $i, j = 0, 1, 2, 3$ kde $i \neq j$.

a) Jaké má teorie T izomorfní spektrum?

b) Vyjmenujte všechny jednoduše kompletní extenze teorie T.

c) Je T rozhodnutelná?

- a) $I(k, T) = 1$ pro $\kappa \geq 4$ (pro každou kardinalitu ≥ 4 máš spektrum 1, pro κ menší to model nemá) (viz. příklad 3.1.21.)
- b) jednoduchá ($P(T) = P(S)$), kompletní (\Leftrightarrow má 1 model), extenze ($M(S) \subseteq M(T)$) S:

- rozsíření o systém axiomu: "existuje nekonečně prvků" (pro každé n přidám: $\exists x_1, \dots, x_n (\bigwedge_{0 < i < j \leq n} x_i \neq x_j)$)

Poznámka: $\exists x_1, \dots, x_n (\bigwedge_{0 < i < j \leq n} x_i \neq x_j)$ tohle tvrdí, že existuje takový ohodnocení proměnných x_1 až x_n , že nejsou žádný dvě ohodnoceny stejně. Tedy že máš alespoň tolik možností, jak který prvek ohodnotit, kolik sis vymyslel proměnných, tzn. máš *alespoň* (\geq) n prvků.

No a axiom je konečný, čili tohle můžeš napsat pro libovolně velké n , ale nemůžeš do toho dotlouct "existuje těch proměnných nekonečně mnoho". Na to v predikátové logice nemá výrazový prostředky, takže si pomůžeš tím, že do té extenze přidáš ne jeden axiom, ale nekonečně mnoho axiomů..

Pro každé n to bude "ex. alespoň n prvků" a tím máš zaručeno, že jedinej model je nekonečněj - protože pro každéj konečnéj model o kardinalitě m najdeš $n_0 > m$, že máš v teorii axiom, který požaduje alespoň tolik prvků.

"Existuje právě" je prodloužení tohoto výroku o to, že "pro libovolné ohodnocení proměnné y vím, že bude stejné jako jeden z x ", tedy že nemám už žádný jiný prvek, kterým bych mohl to poslední y odlišit.

- každé rozsíření o axiom: „existuje právě n prvků“ ($\exists x_1, \dots, x_n (\bigwedge_{0 < i < j \leq n} x_i \neq x_j \ \& \ \forall y (\bigvee_{0 < i \leq n} x_i = y))$) pro $n \geq 4$
- c) podle b) existuje kompletace T a z jejího tvaru je vidět že jí lze vzít jako $\Delta_1 \Rightarrow T$ je rozhodnutelná

Prahdna teorie v jazyce $\langle c \rangle$ kde c je konstantní symbol

a) je kompletní

b) je ω -kategorická

c) je rozhodnutelná?

a) není, dokážeme existenci 1prvkového $\langle \{0\}, c \rangle$ i 2prvkového modelu $\langle \{0, 1\}, c \rangle$ a formuli $\forall x (x = c)$ která je nezávislá (v jednom modelu platí v druhém ne)

b) je, model $\langle \mathbb{N}, c \rangle$ je isomorfní se všemi modely velikosti ω (c je funkční symbol)

c) je - Σ_1 axiomizována (nemá žádné axiomy) a protože má nějakou kompletaci:

- rozsíření o systém axiomu: "existuje nekonečně prvků" (pro každé n přidám: $\exists x_1, \dots, x_n (\bigwedge_{0 < i < j \leq n} x_i \neq x_j)$)

- každé rozsíření o axiom: „existuje právě n prvků“ ($\exists x_1, \dots, x_n (\bigwedge_{0 < i < j \leq n} x_i \neq x_j \ \& \ \forall y (\bigvee_{0 < i \leq n} x_i = y))$) pro $n \geq 1$

Predikativní logika. Úloha je v logice s rovností, není-li uvedeno jinak.

Bud $\mathcal{A} = \langle A \rangle$ model teorie čisté rovnosti PE.

1) buď A nekonečné. Uveďte všechny podmnožiny A^2 , definovatelné bez parametru ve struktuře \mathcal{A}

2) buď A konečné. Uveďte všechny podmnožiny A , definovatelné bez parametru ve struktuře \mathcal{A} a všechny podmnožiny definovatelné z parametru ve struktuře \mathcal{A}

1) Každá podmnožina A^2 definovatelná v \mathcal{A} je definována nějakou formulí $\varphi(x,y)$, přičemž každá taková by měla být v PE ekvivalentní jedné z formulí \top , $x=y$, $x \neq y$ a \perp , což dává po řadě množiny A^2 , $\{\langle a,a \rangle, a \in A\}$, $\{\langle a,b \rangle, a,b \in A, a \neq b\}$, \emptyset

2) Pro definovatelné bez parametrů vychází s obdobným argumentem jako u 1) množiny A , \emptyset . S parametry je definovatelná libovolná podmnožina A – můžeme si kýžené prvky prostě vyjmenovat, jelikož je jich vždy konečně mnoho.

Dostal sem uspořádání racionálních čísel, $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$; otázky byly:

1) Jaké všechny jednoprvkové podmnožiny \mathbb{Q} lze definovat v $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ bez parametrů?

2) Jaké všechny podmnožiny \mathbb{Q}^2 lze definovat v $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ bez parametrů?

Přičemž množina je definovaná bez parametrů v A s jazykem L , když je to množina $\{\langle a_1, \dots, a_n \rangle : A \models \varphi[a_1, \dots, a_n]\}$ pro nějakou $\varphi \in \text{Fm}_L$.

Po definici definované množiny už nebyly moje znalosti tak úžasné. Vypsal sem mu nějaké množiny, co se daly definovat z nějakých formulí jako $a \leq b$, $a < b$, $a \neq b$, atd., ale neměl sem důkaz -- ani mě žádný nenapadal --, že to jsou množiny všechny. Při pोकecu s Mlčkem sem se dozvěděl, že na to du „překvapivě správně“, neboť $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ je model DeLO, která má eliminaci kvantifikátorů -- tedy by zřejmě stačilo vzít všechny booleovské kombinace atomických formulí a z nich definovat množiny, pak by to měly být množiny všechny. (Pokud sem Mlčka pochopil správně.)

mas P prvovyroky, k tomu $n > 0$ přirozene, pak teda vezmes $\{T_i, i < n\}$ teorie a

hledas axiomaticky systém $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$

T kde sjednoceni modelu T_i pro $i < n$ je roven modelum T

jde o to ze tam resis axiomaticky system (jako v podstate ty axiomy co definuji celou množinu vseh pripustnych formulí, tj to pomoci ceho dokazuješ zda v te teorii neco plati)

a ukazes ze to je tak, ze vezmes n tice kde je φ_i

kde to je vlastne vsechny ntice který vyreberes z vyroku kazdy ty teorie - takže mas vsechny možny ntice co si schopn dat dokupy.

v podstate jen zajistis aby platila vzdy alespon jedna formule ze vseh tech teorií v te ntici

pak ukazes - ze když by tam neco nebylo tak by to nebylo ani v tom sjednoceni modelu

a naopak když tam je neco navíc tak by to byl nějaký spor co si tak pamatují

dukay sporem

"Tezky"

Dostal jsem zkoumat teorii $T = Th(\langle (0,1) \subset \mathbb{R}, \leq^{\mathbb{R}} \rangle)$

Po chvíli přemyslení jsem dospěl k závěru, že tahle teorie bude ekvivalentní s DeLO. (A taky pry opravdu je, ale to se mi nepovedlo dokázat - nicméně to nevadilo).

Tedy zbytek "výzkumu" už bylo obvykle DeLO (bez konce, protože $(0,1)$ je otevřený interval).

Myslím, že kdybych měl zkoumat teorii v pořádku, tak by se mě snad už ani na nic dalšího neptal a odesel bych s jedničkou.

Bohužel jsem mu "dokázal", že T nemá elim.kv., i když správně je, že ji má. To Mlčka moc nepotesilo, a tak mi dal dokázat, že z elim.kv. plyne modelová kompletnost. Jak tady už zaznelo, člověk si může jít sednout a promyslet to, ale po několika minutách se asi nudil, a tak mi řekl, ať už mu to jdu předvest. Dokaz jsem měl skoro celý, chybel jeden krok - navrhnul mi dvojku.

Rikal jsem si, proč to nezkusit rovnou na 1 (krom toho, že jsem byl mega šťastnej, že to vůbec mám ☺).

Tak se mě zeptal na jeden silně nerozhodnutelný a jeden rozhodnutelný model teorie teles. Ten silně nerozhodnutelný je zcela určité standardní \mathbf{Q} , a rozhodnutelný je nějaký model teorie uzavřených teles (to už jsem ale nevymyslel, takže jsem odesel s dvojkou).

Vypadá to, že těžká otázka je obvyklá analýza nějaké teorie. Na (možná řečnickou) otázku pana doc. Mlčka, jakou teorii bych měl dostat, jsem odpověděl, že nějakou pěknou jednoduchou - a dostal jsem skutečně tu nejjednodušší, tedy PE (teorie prázdného jazyka s rovností bez axiomů).

Pana Mlčka zajímala

- **kompletnost** - PE není kompletní, kompletace jsou právě extenze o axiomy "existuje právě n prvků" a "existuje nekonečně prvků"

- **rozhodnutelnost** - je rozhodnutelná, protože podle předchozího má Σ_1 kompletaci. Ještě je potřeba, že je Σ_1 -axiomatizovaná, což je nicméně triviální, když nemá žádné axiomy.

- **modelová kompletnost** - není modelově kompletní (to mi trochu napověděl), snadno se najde protipříklad - pro struktury $A = \{0\}$, $B = \{0,1\}$ platí, že obě jsou modelem PE, A je podstruktura B , ale formule $(\exists x, y)x \neq y$ v B platí, ale v A ne, tedy A není elementární podstruktura B

- **eliminace kvantifikátorů** - nemá (plyne z předchozího)

- **izomorfní spektrum** - $I(k, PE) = 1$ pro každé k

Potom se ještě ptal jakými axiomy vyjádřím "existuje nekonečně prvků" (pro každé n přidám: $\exists x_1, \dots, x_n (\bigwedge_{0 < i < j \leq n} x_i \neq x_j)$), jaká je definice 1-koexistence, co se změní, když se do PE přidá jeden konstantní symbol (nic, je to konzervativní extenze).

jestli je f-homogenita silnější než 1-koexistence

Tímto myslel podle mně větu 5.2.5.2) (Eliminační kritérium), resp. Poslední poznámku z 5.2.4. Když pro každé $A \models T$, $B \models T$ lze každé neprázdné konečné parciální vnoření f modelu A do B bezprostředně prodloužit, je T 1-koexistenční. Tedy f -homogenita implikuje 1-koexistenci. (Která je již ekvivalentní s eliminací kvantifikátorů, ze které zase plyne modelová kompletnost, jak již zde bylo řečeno.)

A pozor na to, pojem f -homogenita není v textu k přednášce definován. Je až na konci textu o analýzách teorií na str. 25 (a to až v tom nejnovějším, kterého jsem si třeba já ke zkoušce nevšimla, že byl updatován).

tezka otazka byla docela jednoduchá:

1) mejme konecnou mnozinu K modelu (ve vyrokove logice), najdete její axiomatiku.

reseni: konecnost množiny implikuje uzavřenost, axiomatizovatelná tedy je; stačí vzít pro každou konečnou podmnožinu prvovýroku disjunkci konjunkci předepisující hodnoty odpovídající jednotlivým modelům (tedy pro k -tici prvovýroku něco jako "funkce se na k -tici chová jako první model z K " nebo "... druhy ...").

2) Je K konečně axiomatizovatelná pro nekonečné P ?

Ne, ne, neboť každý výrok axiomatiky fixuje pouze hodnoty konečného počtu prvovýroku.

3) Je doplněk K axiomatizovatelný?

Ne, ne, jinak by K musela být konečně axiomatizovatelná.